

Használati útmutató:

- ☞ Alkalmazás előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt
- ☞ Ajánlott időtartam: 3-12 hét, de krónikus hasnyálmirigy-elégtelenség esetén az egész élettartam folyamán alkalmazható
- ☞ A terméket a táblázatban feltüntetett napi mennyiségnek megfelelően adagolja
- ☞ A táblázatban feltüntetett napi mennyiség csupán tájékoztató jellegű, és a megfelelő testtömeg elérése érdekében módosítható. A napi mennyiség változhat a fajta, a környezet, a testmozgás, a temperamentum és a testfelépítés szerint
- ☞ A napi adag két vagy több étkezésre osztható
- ☞ Amennyiben eddig gyenge minőségű tápot adott kutyádnak, akkor az ajánlott mennyiség 2/3-t tegye ki a régi táp és 1/3-t az új táp. Így etesd 2 héten keresztül
- ☞ 3-4 hét: az ajánlott mennyiség 1/3-a régi táp és 2/3 új táp. Az 5. héttől ajánlott az új tápból adni 100%-os adagot
- ☞ Jó minőségű táp esetén 50-50%-ban lehet keverni a tápokat 2 hétig, a 3. héttől 100%-ban adható az új táp.
- ☞ Mindig legyen friss, tiszta víz kedvenced előtt
- ☞ Az étkezés után minimum 1-2 órát pihenjen a kutyád, elkerülve ezzel a gyomor, vagy bélcsavarodást
- ☞ A napi mennyiség változhat a fajta, a környezet, a testmozgás, a temperamentum és a testfelépítés szerint